

ALI SE ZAVEDAMO NEVARNOSTI SRČNO-ŽILNE BOLEZNI PRI SLADKORNI BOLEZNI TIPA 2? NE, ŠE NE. A JE ČAS, DA SE JE ZAVEMO.

DEJSTVO

Srčno-žilna bolezen je najpogostejši vzrok za smrt ali prizadetost pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2).



425

milijonov ljudi na svetu ima SB2.



2 do 6-krat

večjo verjetnost za **smrt** zaradi srčne in možganske kapi ima človek s SB 2 v primerjavi s človekom, ki te bolezni nima.



629

milijonov ljudi bo – po napovedi IDF – do leta 2045 imelo SB2.

INFO

Mednarodno združenje za sladkorno bolezen (IDF) je letos objavilo rezultate globalne ankete o ozaveščenosti ljudi s SB2 o nevarnosti srčno-žilne bolezni.

12.695

ljudi s SB2 je odgovorilo na anketna vprašanja.



KLJUČNI REZULTATI

2 od 3

sodelujočih ima **tveganje** za srčno-žilno bolezen in/ali so že imeli srčno-žilni dogodek.



1 od 4

sodelujočih še nikoli ni govoril o **dejavnikih** za srčno-žilno tveganje z zdravnikom.



1 od 4

sodelujočih ocenjuje, da ima **nizko tveganje** za srčno-žilno bolezen.

3 od 4

sodelujočih se zanaša, da bodo informacijo o srčno-žilni bolezni dobili od zdravnika.



POMEMBNO!

- Udeleženci raziskave pri svoji bolezni, SB2, podcenjujejo tveganje za srčno-žilno bolezen.
- Informacije in nasvete o srčno-žilni bolezni udeleženci raziskave poiščejo pri zdravniku.



- V nekaterih primerih med zdravnikom in človekom s SB2 o srčno-žilnih tveganjih ni zadostne komunikacije.
- Izboljšati moramo ozaveščenost nevarnosti srčno-žilne bolezni pri ljudeh s SB2 za njihove boljše izide zdravljenja in kakovost življenja.